

10 公里左右，谷缘山顶到谷底的切割深度可达 2000 米，谷底宽度为 80 米~100 米，堆积阶地很少。山坡与谷坡的坡度一般为 45 度左右，有的地段达 60 度。最低海拔处是山岩乡与巴塘县交界处的金沙江谷底，为 2640 米；最高海拔处是麻绒乡与巴塘县的界山麻贡嘎山峰，为 5725 米。

三、古夷平原比较发育，是县内东部地貌的重要特征。沙鲁里山西坡系保存比较完好的古夷平面，构成现在的高原面。

上述地貌特征的差异性，使县境可分 3 个地貌小区，即：东部丘状高原区，中部山原深谷区，西部高山峡谷区。

第三节 山 脉

县境除横断山脉、沙鲁里山脉外，还有一些主要山峰。

一、麦拉（山）

麦拉，又名米拉，藏语译音为“黑痣”。相传主峰为山神眉间黑痣，故名。东西跨越 20 公里，南北延伸 17 公里，主峰海拔为 4921 米。是白玉片区与盖玉片区的分界山，距县城约 40 公里。

二、欧业拉（山）

欧业拉，又名火龙山，是火龙、打龙、欧业 3 座山的总称，以欧业为习惯称呼。东西跨越 12 公里，南北延伸 30 公里，主峰海拔为 4958 米。为县城通往山岩乡的门户。

第三章 水 文

第一节 河 流

均属金沙江水系。计有河、沟、溪 230 条，其中流域面积在 100 平方公里以上的有 35 条，总长为 3608.7 公里，平均河流密度为 0.348 公里/平方公里。

全县江河多年平均径流总量为 36.37 亿立方米，人均占有地表水径流量 8.56 万立方米。还有 5.58 亿立方米的过境流量。

河流的落差大，约为 10 米/公里；水能蕴藏量为 124.45 万千瓦，可开发利用量为 70 万千瓦。

主要河流有：