

第二节 森林植被

一、类型

白玉森林大部分是暗针叶原始林，也有少部分次生的杨、桦阔叶落叶林，是西南高山原始林区的重要组成部分。主要类型有：

（一）亚高山常绿针叶林

分云杉林（藓类云杉林、杜鹃云杉林、高山灌丛云杉林）、冷杉林（藓类冷杉林、杜鹃冷杉林、杨桦冷杉混交林、高山栎冷杉混交林）、圆柏林（密枝圆柏林、大果圆柏林、高山柏林）、高山松林。

（二）亚高山落叶阔叶林

分杨桦混交林、河漫滩沙棘林。

（三）山地硬叶常绿阔叶林

分阴坡、半阴坡高山栎乔林，半阴坡高山栎矮林。

二、树种

主要有：

（一）松科

分云杉属（川西云杉）、冷杉属（黄果冷杉、鳞皮冷杉）、松属（高山松）。

（二）柏科

为圆柏属，分密枝圆柏、大果圆柏、高山柏。

（三）山毛科

为栎属，系高山栎。

（四）桦木科

分桦属（红桦、白桦）、鹅耳属（鹅耳）。

（五）杨柳科

分杨属（山杨、青杨）、柳属（河柳、高山柳）。

（六）蔷薇科

分桃属（野毛桃、光核桃）、杏属（藏杏）、樱桃属（山樱桃）、苹果属（花叶海棠、实叶海棠、引种苹果）、花属（月季）。

（七）豆科

为槐属，系洋槐（引种）。

（八）桑科

为桑属，系岩桑。

(九) 胡桃科

为核桃属，系核桃（引种）。

(十) 卫茅科

为卫茅属，系卫茅。

(十一) 木科

为丁香属，系丁香。

(十二) 杜鹃花科

为杜鹃属，分大、小叶杜鹃。

(十三) 胡颓子科

主要为沙棘。

(十四) 榆科

主要为榆树。

第三节 珍稀植物

县境上麻绒、昌台、热加、赠科、登龙等地的森林，为青藏高原特有种白唇鹿自然保护区特用林；热加乡阿仁沟口有面积 640 公顷、蓄积量为 48952 立方米的一片原始密枝圆柏林，是目前国内已发现的此树种海拔最高的大面积分布地区，具有较高科研价值。

第七章 野生动物

第一节 国家一类保护动物

一、白唇鹿

集中分布在上麻绒的察青松多，安孜乡的达伊科，辽西乡的巴其科，登龙乡的阿木沟，盖玉乡昌都科、拉日科、查卡科等地。种群数量大，全县有 3000 头以上。

二、云豹

藏语称“热”，数量很少，偶有发现。