

部。能治疗一般妇科疾患，处理一般难产和产妇婴儿急救。1983年，建立独生子女档案，实行免费保健医疗，并设立儿保门诊。

1992年，全县妇幼保健救助网络基本形成。特别是在逐年新增区乡卫生院的基础上，基本形成城市（县级卫生医疗机构）—区乡卫生院—农村（村卫生室）三级卫生保健网络。但由于特殊的地理环境导致交通不便，三级保健网络不完善。

2006年，全县19个乡（镇）有卫生院，有的村新建了村卫生室。

## 第二节 妇女病防治与儿童保健

### 一、妇女病防治

1988年，县妇幼保健院和县妇联的共同组织先后开展妇女病普查普治5次，普查1226人，查出患妇科病782人，其中患滴虫性阴道炎220人、细菌性阴道炎198人、宫颈糜烂224人、盆腔炎108人、患其他病32人。根据各自的病理特点有针对性地进行治疗。

1993—1997年，县妇幼保健院又组织全院的业务骨干对全县机关、农牧民群众妇女病普查与普治，共对450名妇女进行检查，查出患妇科病160人。其中患滴虫性阴道炎12人、霉菌性阴道炎8人、宫颈糜烂42人、盆腔炎23人、患其他病75人。

1998—2002年，开展一次规模较大的妇科常见病、多发病普查，共普查妇女286人，查出患妇科病230人，其中患滴虫性阴道炎36人、细菌性阴道炎63人、宫颈糜烂112人、盆腔炎13人、患其他病6人。治疗人数达210人。

### 二、儿童保健

1998—2006年，通过每年的定期保健工作，使新龙县0~6岁儿童受益人数达960人次。

表 21-24 1998—2006年儿童保健基本情况表 单位：人、%

年份	儿童数	参与保健数	保健率%	婴儿死亡数	死亡率%
1998	3110	966	31	36	68
1999	3192	1346	42	32	31.5
2000	1501	239	15.9	11	0.73
2001	1689	520	30.8	16	0.95
2002	3383	1838	54.33	10	2.61
2003	1268	706	55.69	8	1.91
2004	3326	1667	50.12	8	1.97
2005	2907	649	22.33	0	0
2006	2300	478	20.78	12	3.03

## 第三节 卫生保健技术

### 一、新法接生

1987 年，新法接生率基本稳定在 70% 以上（其中住院分娩占 20%、请医生到家助产的占 80%）。产妇死亡率由新中国成立前的 30.25‰，下降到 1.21‰；婴儿死亡率由新中国成立前夕的 10‰下降到 2.125‰。此外，还开展孕、产妇系统管理，发放消毒脐带卷，进行上环、剖宫产、女扎等工作。

根据少数民族地区的特点，在卫生工作中把妇幼卫生的宣传工作放在重要地位。各级妇幼卫生专兼职人员利用开会学习、下乡、图片、散发宣传资料和个别走访等方式进行妇幼卫生和新法接生的宣传。

新法接生在 20 世纪 90 年代，城区基本达到 100%，广大农牧区（特别是交通不便的边远农牧区）还停留在 20% ~ 30% 之间。2000 年后，辅以发放消毒脐带卷的办法和提倡住院分娩新法接生（接生者的手、产妇会阴、脐带、接生包四消毒），在按照“母亲安全、儿童优先”的原则下，搞好新法接生，有力地保证了儿童健康成长，降低了儿童死亡率和新生儿破伤风的发生。

2002—2006 年，向全县各乡村发放妇儿卫生知识宣传资料 1500 多份，在城区以孕妇学校、板报等形式宣传 5 次以上。

### 二、住院分娩

1988—2006 年，凡在医院分娩的产妇一律实行住院分娩，使孕产妇的死亡由每年的 3 ~ 5 人降到 2006 年的 0 ~ 1 人。

### 三、提倡母乳喂养

在 20 世纪 80 年代初，一般婴儿哺乳期多用人乳及牛乳混合喂养，无奶者多用糟粑糊。1990 年代，广泛宣传母乳喂养的好处，在城区纯母乳喂养达 90% 以上，农牧区达 20% ~ 30%。2000 年后，县妇幼保健院组织专门技术人员对城区和农村婴幼儿实施母乳喂养情况调查。专项抽样调查结果：母乳喂养城市高于农村，农村人工喂养及混合喂养率达 70% 以上，其原因在于，绝大多数年轻母亲孕期不注意营养，产后缺奶和喂奶知识缺乏，加之家庭收入增加，社会上各种代乳品易购。边远农牧区因交通闭塞，文化落后，卫生习惯差，母亲为避孕而延长哺乳期，直到小孩 2 ~ 3 岁才断奶，所以营养不良、缺铁性贫血、佝偻病等在边远农牧区普遍比城镇高。2004 年，对全县 736 人名婴幼儿哺乳调查，其中：母乳喂养 650 人，占 88.31%；母乳和牛乳混合喂养 30 人，占 4.0%；牛乳喂养 10 人，占 1.6%；母乳加酥油 46 人，占 6.3%。

母乳喂养分为纯母乳喂养、部分母乳喂养、混合喂养三种，凡是在县“爱婴医院”出生的婴儿，全部实施了纯母乳喂养。但在广大的农牧区还是有部分母乳喂养，所占比例为 25%。而混合喂养只占了 10%。

### 四、儿童病防治

对儿童常见病、多发病、地方病的防治纳入历年的工作目标，采取广泛听取、多方综合、有针对